



I.sz. Belgyógyászati Klinika  
Igazgató: Prof. dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár  
Gasztroenterológiai Osztály  
Vezető: Prof. Dr. Hunyady Béla egyetemi tanár

7624 Pécs, Ifjúság u. 13. Tel.: 72/536-000/32615, 32616 Fax: 72/536-148

A M B U L Á N S L A P

024323127

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534  
Születési név...: Esetszám.....: 19691899  
Születési dátum: 1963.12.18 TAJ.....: **025-293-434**  
Születési hely.: Siklós Naplósám.....: 03000135  
Anyja neve.....: Baranyai Lídia Foglalkozás...: Élelmiszergyártó gép  
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16.  
Felvételi dátum: 2023.02.02 10:40 Állampolgárság: HUN  
Beküldő.....: 024323127 Térítési kat...: 1

**Diagnózis**

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
A4980	Egyéb bakteriális fertőzések k.m.n. lokalizációban	N

**Beavatkozások**

11302	Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina keretében	1	566
-------	---	---	-----

**Anamnézis**

1995-ben igazolódott Crohn betegség (colitis ulcerosa) igazolódott (jobb colonfél ceruzányi szűkülete volt). Kezdetben véres volt a széklete, egyéb tünetet nem tapasztalt (hasmenés, fájdalom vagy láz nem volt). Viszérműtét a lábon 20-on éves korában. 2-3 éve hypetonia. 2012.05.02. colonoscopia szövettanilag is igazolt chronicus colitises jeleket igazol colitis ulcerosára jellemző képpel. 2014.10.08. A calprotectin mérés eredménye: 208 ug/g A calprotectin mérés eredményének értékelése: >200ug/g: pozitív. DEXA történt, normál tartományú csontsűrűség. 2015.01. Colonoscopia: középsúlyos M. Crohn a terminalis ileumban és a colon ascendensben.

2019.novemberben: bal v. póoplitea mélyvénás thrombosis igazolódott Siklói Sebészeti rendelésen Duplex UH scan és klinikum alapján. Anticoagulánst nem kapott.2021.03. Colonoscopia: inflammatoricus pseudopolypok és korábbi gyógyult hegek.

2021.03.12. Colonoscopia: Korábbi gyógyult hegek a Bauchin billentyűn és a bal colonfélben, 1-1 minor pseudopolyp és inflammatoricus polyp biopsiás eltávolítása.

2023.01.17. MRI: Elágazó, intersphinctericus fistulájára heges reziduuma a rectum alsó harmada mentén, a jobb farpofába tartóan, aktivitás jele nélkül (Van Assche index: 4). A középvonalban az os coccygeum alatt halmozó falú, gyulladáshoz vezető cystosus képlet (látszólag hígabb bennéssel), mely első sorban sinus pilonidalis lehet. Emiatt sebészeti konzílium javasolt.

Gyógyszerei: Ramas 1x1, Prelow 1x1, Salazopyrin EN 2x500(10 éve szedi) naponta 2x1000 mg, Apo-Famotidin 2x40 mg, Imuran 200 mg, Eliquis.

Gyógyszerérzékenység: nem tud róla. Salofalk mellett gyógyszerundor.

**Vizsgálatok**

Entamoebiasis miatt javasolt T. Klion 3x500 mg kezelése 10 napig. Kontroll alkalmával széklet leoltása ismételtén javasolt immunosuppressiv kezelés mellett észlelt tápcsatornai infekciója miatt.

**Terápia:**

Mai napon telefonos konzultáció történt. PTE - Parazitológiai széklet leoltás eredménye.  
Giardia pozitív. Javasolt T. Klion 3x500 mg.(10 napig).

**Felírt gyógyszer:**

2023.02.02	KLION 250 MG TABLETTA 20x	R:2 D:2 E:2 LE:0	4.0 222302055747388686
	buborékcsomagolásban	TABLETTA	

Pécs, 2023.02.02

.....  
Czimmer József Dr.  
58785  
egyetemi docens

Táppénz igénye esetén 48 órán belül kezelési lapunkkal családorvosánál jelentkezze:  
A kórismére és a kezelési tervre vonatkozó szükséges tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem.  
Az aktuális ambulánslap egy példányát átvettem

.....  
beteg aláírása