



Klinikai Központ
Orvosi Képpalkotó Klinika
Orvosi Képpalkotó Klinika MRI 024325221
7624 Pécs Ifjúság u. 13. Tel.:6(72) 535-813 Fax:(72) 536-199

RADIOLÓGIAI LELET

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési dátum....: 1963.12.18 Esetszám: 20173356
Anyja neve.....: Baranyai Lidia Telj. AZ: 32166115
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. TAJ.....: **025-293-434**
Vizsgálatkérő.....: B140 024323127 23127 I.Belkl. Gasztroent. II.
Naplósorszám.....: 00001295 03001121 TKAT1

Kért vizsgálatok:

HASP Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

Iránydiagnózis: K5090 Crohn-betegség, k.m.n.
Iránydiagnózis: K5090 Crohn-betegség, k.m.n.

Eredmény diagnózis:

Lelet:

Natív és kontrasztanyagos kismedencei MR vizsgálat perianalis fistula illetve elváltozások kontroll céljából.

Összehasonlítva 2023 januári hasonló vizsgálatával:

Jobb oldalon, 7 óra magasságában intersphincterikusan, egyenes lefutást mutató, korábbi fistulajarat heges maradványa látható, ami jelenleg is legfeljebb 5 mm vastagságú, T2 jelszegény köteg. Ebben folyadék tartalom most sem mutatható ki, nyílás nem azonosítható. Novum fistula járat nem jelent meg.

Az előzményen a középvonalban a bőrfelszín alatt az os coccygeumtól caudalisan látott, sinus pilonidalis cystának imponáló eltérések feltárása után helyüknek megfelelően látszólag mindkét farpofában feülületesen és a commisurát érintően legfeljebb 4-5 mm vastagságú T2 jelszegény heg maradt vissza, illetve az os coccygeum alsó szélének magasságában a középvonaltól jobbra, 13 mm hosszúságban legfeljebb 3 mm átmérőjű, T2 közepes jelmenetű kis sáv ábrázolódik, mely mérsékelt diffúziógátlást jelez T1 postkontrasztos mérés alapján benne csak filmszerű folyadék tartalom sejthető, keskeny, halmozó fal mellett.

A rectum falán gyulladás nem látszik. Sphincterek szabályosak. A kismedencében kóros nyirokcsomó vagy kóros lágyrészképlet nem azonosítható, szabad hasi folyadék nem mutatható ki. A látótérbe került csontok érdemi eltérés nélkül.

Vélemény:

Hegesen záródott intersphincterikus fistula járat nyoma jobb oldalon változatlanul.

AZ MR előzményen látott abscedalo sinus pilonidalis cystának imponáló középvonali elváltozás feltárásra került, helyének megfelelően részben heg, részben keskeny sávyszerű elváltozás maradt vissza, mely sarjadzó residuumnak felelhet meg minimális folyadék komponenssel. Ennek környezetében sem most, sem előzményén nem volt fistula.

Beavatkozások:

34941	Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg	1	30889
-------	---	---	-------

Vizsgálat ideje: 2024.05.09

Nyomtatva.....: 2024.05.17

.....
Faluhelyi Nándor Dr.
63437
egyetemi adjunktus

Eredményt bevitte.....: Faluhelyi Nándor Dr.
Beteget felvevő személy: Vámosné Barcatta Eszter

Jóváhagyva: 2024.05.17 12:04

A radiológiai felvételek az adott beteg gyógyításával kapcsolatos teendőkön túli bármilyen nemű felhasználása csak az Orvosi Képalkotó Klinika hivatalos, írásos engedélyével lehetséges!

Amennyiben Ön úgy nyilatkozott, hogy lemezt kért képi vizsgálatairól, akkor az DICOM formátumú, amely automatikusan elindul. Amennyiben ez mégsem történne meg, akkor a lemez főkönyvtárában lévő MEDVIEW vagy a Lite.exe file-ra kattintva, elindul a program.