



Diazepám (DIAZEPAM DESITIN) rectalis oldat (5 és 10 mg)

Hatóanyag: 5 mg, ill. 10 mg diazepamot tartalmaz tubusonként.

Gyógyszerforma: végbéloldat. Átlátszó, színtelen vagy halvány sárgás vizes oldat LDPE kupakkal lezárt LDPE csőrös tubusban.

Gyógyszercsoport: benzodiazepin-származék.

Hatása: a diazepám egy, az 1,4-benzodiazepinek csoportjába tartozó pszichotrop gyógyszer. A csoportba tartozó szerekre kifejezetten jellemző a feszültség, az izgatottság és a szorongás csökkentése, emellett szedatív és hipnotikus hatással rendelkeznek. Ezekon túl, a diazepám izomrelaxáns és antikonvulzív hatású is.

Javallat: görcsroham megszüntetésére, MAD (Mucosal Atomization Device) gyógyszerporlasztó hiányában.

Adagolás: kizárólag rectalisan adható.

- gyermek: 15 kg alatti testtömeg esetén 5 mg, 15 kg felett 10 mg.
- felnőtt: 20 mg (2 db 10 mg-os tubus).

Alkalmazása csak lélegeztetési készülékben történhet! Görcsroham megelőzésre nem alkalmas, ezért lezajlott convulsio után használata indokolatlan!

Ellenjavallatok:

- benzodiazepin allergia, vagy a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység
- myasthenia gravis
- légzési elégtelenség
- alvási apnoe szindróma
- súlyos májelégtelenség
- 1 év alatti életkor
- glaucoma
- terhesség
- akut altató, alkohol, fájdalomcsillapító vagy pszichofarmakon (neuroleptikumok, antidepresszánsok vagy lítium) mérgezés.
- függőséggel járó rendellenességek (alkohol, vényköteles gyógyszerek, illegális kábítószer).
- verebellaris vagy spinalis ataxia.
- mivel a Diazepam Desitin benzil-alkoholt tartalmaz, a készítmény koraszülött csecsemőknél nem alkalmazható.

Alkalmazás: a készítmény sapkájának lecsavarása után vezessük be a tubus végét teljesen a rectumba (15 kg alatti gyermekeknél csak félig). Tartsuk a tubust a cső végével lefelé, majd a tubus tartalmát teljesen ürítsük ki. A szívóhatás elkerülése érdekében a tubust tartsuk összenyomva a rectumból történő eltávolításig. Szorítsuk össze a beteg farpofáit rövid ideig.

Különleges tárolási előírások: legfeljebb 25 °C -on tárolandó.

Felhasznált irodalom:

1. <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> 2020. 06. 09.
2. Gyógyszerbeviteli utak a prehospitalis ellátásban. Szabványos Eljárásrend. Országos Mentőszolgálat. v2.0 / 2020.05.15.