



Midazolam (DORMICUM) injekció (5 mg/1 ml)

Hatóanyag: 5 mg midazolámot (midazolám-hidroklorid formájában) tartalmaz 1 ml-es ampullánként.

Gyógyszerforma: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen, szagtalan, steril vizes oldat. 1 ml oldat kék és sárga kódgyűrűvel, valamint fehér törőponttal ellátott színtelen ampullába töltve.

Gyógyszercsoport: Altató és nyugtató, benzodiazepin-származék.

Hatása: A Dormicum gyors hatású, rövid hatástartamú altató és szedatív hatású gyógyszer. Anxiolitikus, antikonvulzív és izomrelaxáns tulajdonságokkal is rendelkezik. Hipnotikus és amnéziát okozó hatású.

Javallat: Mentőápoló **kizárólag** központi idegrendszeri eredetű görcstevékenység megszüntetésére, MAD (Mucosal Atomization Device) gyógyszerporlasztó használatával, intranasalisan alkalmazhatja.

Adagolás:

- 0,2 mg/kg hígíthatlanul, intranasalisan (in.) – maximum 10 mg
- mentőápoló a midazolámot nem ismételheti még ismétlődő/nem szűnő görcsroham esetén sem!

Ellenjavallat:

- a hatóanyaggal, vagy bármely segédanyagával és egyéb benzodiazepinekkel szembeni túlérzékenység
- súlyos alkohol-mérgezés
- hemodinamikai instabilitás
- intranasalis gyógyszeradagolás ellenjavallatai (lásd az „*Intranasalis gyógyszerelés a prehospitalis ellátásban*” c. eljárásrendet).

Alkalmazás: részletesen lásd az „*Intranasalis gyógyszerelés a prehospitalis ellátásban*” és „*A görcsrohammal (convulsióval) járó rosszullétek prehospitalis ellátása*” c. eljárásrendet.

Mellékhatások, túladagolás: A többi benzodiazepinhez hasonlóan, a midazolám általában álmoságot, ataxiát, dysarthriát és nystagmust okoz. A midazolám túladagolása önmagában ritkán életveszélyes, de areflexiához, apnoéhoz, hypotensióhoz, cardiorespiratoricus depresszióhoz és ritka esetekben kómához vezethet.

Különleges tárolási, felhasználási előírások: fénytől védve tárolandó. Használat előtt ellenőrizni kell az ampulla átláthatóságát. Csak a tiszta, részecskéktől mentes Dormicum oldatos injekció használható fel. A Dormicum oldatos injekció a következő oldatokkal kompatibilis: 0,9%-os nátrium-klorid-oldat, 5%-os dextróz-oldat, 10%-os dextróz-oldat, 5%-os levulóz-oldat, Ringer-oldat, Hartmann-oldat.

Felhasznált irodalom:

1. Pharmindex. Dormicum. In: Pharmindex. Budapest: Vidal Next Kft.; 2020 [updated 2020 June].
2. <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> 2020. 06. 18.
3. László E, Radnai M, Petróczy A, Orphanides I: Intranasalis gyógyszerelés a prehospitalis ellátásban. Szabványos eljárásrend. Országos Mentőszolgálat. v2.0 / 2019.10.14.
4. Kocsis T, Petróczy A, Solténszky M, Toldi F: A görcsrohammal (convulsióval) járó rosszullétek prehospitalis ellátása. Szabványos Eljárásrend. Országos Mentőszolgálat. 2017.