



## **Prednizon (RECTODELT) végbélkúp** (30 mg)

**Hatóanyag:** 30 mg prednizon (mikronizált) kúponként.

**Gyógyszerforma:** végbélkúp. Zöld színű, torpedó formájú, homogén végbélkúp.

**Gyógyszercsoport:** szisztémás kortikoszteroid, glükokortikoid.

**Hatása:** glükokortikoid hatású, antiexsudatív, antiproliferatív, antiflogisztikus, immunszuppresszív, antiallergiás tulajdonságokkal rendelkezik és befolyásolja az anyagcserét.

### **Javallat:**

- krupp  
Krupp esetén az elsőként választandó készítmény a dexametazon tableta – kooperáló gyermek esetén részesítsük előnyben a rectalis prednizon adagolásával szemben.
- akut asztmás roham gyermekeknél

### **Adagolás:**

Amennyiben a per os dexametazon adása nem kivitelezhető, adjunk, **adassunk** a szülővel **30 mg Rectodelt** kúpot per rectum (ha még nem kapott). Ez a mennyiség minden betegnél alkalmazható egy alkalommal, akár kicsit felette, akár kicsit alatta van az ajánlott dózishoz. A kicsomagolt kúpot helyezzük fel óvatosan az anuson, majd a belső sphincteren keresztül (a könnyebb bevezethetőség érdekében használhatunk kézkrémet/vazelint is). Ügyeljünk arra, hogy a kúp ne csússzon ki a rectumból, ennek érdekében rövid ideig szorítsuk össze a farpofákat. Gyermekek esetén megkérhetjük a szülőt is a kúp beadására.

**Ellenjavallatok:** Sürgősségi ellátás során abszolút ellenjavallata nincs (kivéve a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység).

**Relatív ellenjavallat (általában nem vagy különösen óvatosan adható):**

Gyomor- és nyombélfekély, súlyos osteoporosis, súlyos hypertonia, vakcináció időtartama. Vírusinfekciók: herpes simplex, herpes zooster, varicella. Szisztémás gombás megbetegedések, amoebiasis, glaucoma, poliomyelitis (a bulbaris-encephalitis forma kivételével), BCG oltást követő lymphadenitis. Ahogy minden glükokortikoid használatakor, a Rectodelt terápia megkezdése esetén is a várható előny és kockázat kritikus mérlegelése szükséges.

**Nem kívánatos hatások, mellékhatások:** rövid távú, az adagolási ajánlások szem előtt tartásával és a betegek gondos monitorozásával végzett kezelés során csekély a mellékhatások kockázata.

**Különleges tárolási előírások:** legfeljebb 25°C-on tárolandó.

### **Felhasznált irodalom:**

1. <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> 2020. 06. 09.
2. Gyógyszerbeviteli utak a prehospitalis ellátásban. Szabványos Eljárásrend. Országos Mentőszolgálat. v2.0 / 2020.05.15.
3. A krupp prehospitalis ellátása. Szabványos Eljárásrend. Országos Mentőszolgálat. v2.0 / 2020.05.07.